

		休業終了日
		Day14
注射	<p>■---【注射】</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 生理食塩液 20mL … 10mL CVP穿刺用 1回</p> <hr/> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 テルモ生食 100mL … 100mL アロキン静注 0.75mg 5mL … 1瓶 デキザト注射液6.6mg 2mL … 1mL ホラミン注 5mg 1mL … 1A 所要時間:0時間30分 ① インラインフィルター付き輸液セット使用 1回</p> <hr/> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 テルモ生食 100mL … 100mL 【非探】ヘクセチルス … 6mg/kg 所要時間:1時間0分 ② 1回</p> <hr/> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 生理食塩液PL「フソー」 50mL … 50mL 所要時間:0時間30分 ③ 1回</p> <hr/> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 大塚糖液 5% 250mL … 250mL レボホリナート … 200mg/m² 所要時間:2時間0分 ④-1メインルート 1回</p> <hr/> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 大塚糖液 5% 250mL … 250mL イリリカン … 150mg/m² 所要時間:2時間0分 ④-2側管よりレボホリナートと同時に投与 1回</p> <hr/> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 生理食塩液PL「フソー」 50mL … 50mL 5-FU … 400mg/m² 所要時間:0時間15分 ⑤ 1回</p> <hr/> <p>抗悪性腫瘍剤局所持続注入 … 1 テルモ生食 100mL … 0.01mL 5-FU … 2400mg/m² 所要時間:46時間0分 ⑥ 総量140mlになるように生食調整 1回</p> <hr/> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ10mL 100単位 … 1筒 ヘパフラッシュ後、抜針 1回</p>	
	投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>アプレタトカプセルセット「サワイ」(3日分) … 1セット 分1 朝食後 初日は点滴開始前に服用 1日</p> <hr/> <p>デカロン錠 0.5mg … 16錠 分2 朝食後 治療翌日より2日間 2日</p> <hr/> <p>ミサイクイン塩酸塩カプセル100mg「日医工」 … 4cap 分2 朝夕食後 14日</p> <hr/> <p>ビトキサル錠 30mg … 2錠 分2 朝夕食後 14日</p> <hr/> <p>ビーゾフテンロ-ション0.3% (50g/本) … 100g 適時 1日</p> <hr/> <p>リンデロン-VG軟膏0.12% (5g/本) … 5g 医師の指示通り 皮疹のひどいところ 1日</p>