

		休業終了日
	Day1	Day14
注射	<p>■---【注射】</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 生理食塩液 20mL … 10mL CVP穿刺用 1回</p> <p>-----</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 テルモ生食 100mL … 100mL アロキン静注 0.75mg 5mL … 1瓶 テキサト注射液6.6mg 2mL … 3mL 所要時間:0時間30分 ① 1回</p> <p>-----</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 テルモ生食 100mL … 100mL ペハシスマブ … 5mg/kg ② 初回90分、2回目60分、3回目以降30分で投与 1回</p> <p>-----</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 大塚糖液 5% 250mL … 250mL イリテカン … 150mg/m<sup>2</sup> 所要時間:2時間0分 ③ 1回</p> <p>-----</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 大塚糖液 5% 250mL … 250mL レボホリナート … 200mg/m<sup>2</sup> 所要時間:2時間0分 ④-1メインルート 1回</p> <p>-----</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 大塚糖液 5% 250mL … 250mL オキサプラチン … 85mg/m<sup>2</sup> 所要時間:2時間0分 ④-2側管よりレボホリナートと同時に投与 1回</p> <p>-----</p> <p>抗悪性腫瘍剤局所持続注入 … 1 テルモ生食 100mL … 0.01mL 5-FU … 3200mg/m<sup>2</sup> 所要時間:48時間0分 ⑤ 総量150mlになるように生食調整 1回</p> <p>-----</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ10mL 100単位 … 1筒 ヘパフラッシュ後、抜針 1回</p>	
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>アプレピタントカプセルセット「サワイ」(3日分) … 1セット 分1 朝食後 初日は点滴開始前に服用 1日</p> <p>-----</p> <p>デカドロン錠 0.5mg … 16錠 分2 朝食後 治療翌日より3日間 3日</p>	