

大腸がん FOLFOXIRI療法

		休薬終了日
	Day1	Day14
注射	<p>■---【注射】</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 生理食塩液 20mL … 10mL CVP穿刺用 1回</p> <hr/> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 テルモ生食 100mL … 100mL アロキシ静注 0.75mg 5mL … 1瓶 デキサート注射液6.6mg 2mL … 3mL 所要時間:0時間30分 ① 1回</p> <hr/> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 大塚糖液 5% 250mL … 250mL イリリガン … 150mg/m<sup>2</sup> 所要時間:2時間0分 ② 1回</p> <hr/> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 大塚糖液 5% 250mL … 250mL レボホリナート … 200mg/m<sup>2</sup> 所要時間:2時間0分 ③-1メインルート 1回</p> <hr/> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 大塚糖液 5% 250mL … 250mL オキサリプラチン … 85mg/m<sup>2</sup> 所要時間:2時間0分 ③-2側管よりレボホリナートと同時に投与 1回</p> <hr/> <p>抗悪性腫瘍剤局所持続注入 … 1 テルモ生食 100mL … 0.01mL 5-FU … 3200mg/m<sup>2</sup> 所要時間:48時間0分 ④ 総量150mlになるように生食調整 1回</p> <hr/> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ*10mL 100単位 … 1筒 ヘパフラッシュ後、抜針 1回</p>	
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>アプレピタントカプセルセット「サワイ」(3日分) … 1セット 分1 朝食後 初日は点滴開始前に服用 1日</p> <hr/> <p>デカトロン錠 0.5mg … 16錠 分2 朝食後 治療翌日より3日間 3日</p>	