

		休業終了日	
		Day1	Day15
		Day28	
注射	<p>■---【注射】</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 生理食塩液 20mL … 10mL CVP穿刺用 1回</p> <p>-----</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 デキサト注射液6.6mg 2mL … 1mL グラニセロン点滴静注液3mgﾊﾞｯｸﾞ「日医工」 100mL … 1袋 所要時間:0時間30分 ① 1回</p> <p>-----</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 大塚糖液 5% 250mL … 250mL ｲﾉﾉﾃｶﾝ … 125mg/㎡ 所要時間:1時間30分 ② 1回</p> <p>-----</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 テルモ生食 100mL … 100mL 所要時間:0時間30分 ③ 1回</p> <p>-----</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 へパフラッシュ10単位/mLｼﾘﾝｼﾞ10mL 100単位 … 1筒 へパフラッシュ後、抜針 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 生理食塩液 20mL … 10mL CVP穿刺用 1回</p> <p>-----</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 デキサト注射液6.6mg 2mL … 1mL グラニセロン点滴静注液3mgﾊﾞｯｸﾞ「日医工」 100mL … 1袋 所要時間:0時間30分 ① 1回</p> <p>-----</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 大塚糖液 5% 250mL … 250mL ｲﾉﾉﾃｶﾝ … 125mg/㎡ 所要時間:1時間30分 ② 1回</p> <p>-----</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 テルモ生食 100mL … 100mL 所要時間:0時間30分 ③ 1回</p> <p>-----</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 へパフラッシュ10単位/mLｼﾘﾝｼﾞ10mL 100単位 … 1筒 へパフラッシュ後、抜針 1回</p>	
	投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>アプレヒタントカプセルセット「サワイ」(3日分) … 1セット 分1 朝食後 初日は点滴開始前に服用 1日</p> <p>-----</p> <p>デカドロン錠 0.5mg … 16錠 分2 朝食食後 点滴翌日より2日間服用 2日</p>	<p>■---【投薬】</p> <p>アプレヒタントカプセルセット「サワイ」(3日分) … 1セット 分1 朝食後 初日は点滴開始前に服用 1日</p> <p>-----</p> <p>デカドロン錠 0.5mg … 16錠 分2 朝食食後 点滴翌日より2日間服用 2日</p>
	<p>【S-1】</p> <p>1日2回(day1夕～day15朝) BSA 1.25未満:80mg/day 1.25-1.5:100mg/day 1.5以上:120mg/day</p>		