

		休業終了日	
		Day8	Day14
		Day1	Day14
注射	<p>■---[注射]</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 生理食塩液 20mL … 10mL CVP穿刺用 1回</p> <hr/> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 グリセリン点滴静注液3mgパック「日医工」 100mL … 1袋 デキサト注射液6.6mg 2mL … 1mL ホウサン注 5mg 1mL … 1A 所要時間:0時間30分 ① 1回</p> <hr/> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 大塚生食注 250mL … 250mL ア-ビタックス … 250mg/m<sup>2</sup> 所要時間:1時間0分 ② 1回</p> <hr/> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 テルモ生食 100mL … 100mL 所要時間:1時間0分 ③ 1回</p> <hr/> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 大塚糖液 5% 250mL … 250mL レボホリナート … 200mg/m<sup>2</sup> 所要時間:2時間0分 ④-1メインルート 1回</p> <hr/> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 大塚糖液 5% 250mL … 250mL オキサリアチン … 85mg/m<sup>2</sup> 所要時間:2時間0分 ④-2側管よりレボホリナートと同時に投与 1回</p> <hr/> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 生理食塩液PL「フジー」 50mL … 50mL 5-FU … 400mg/m<sup>2</sup> 所要時間:0時間15分 ⑤ 1回</p> <hr/> <p>抗悪性腫瘍剤局所持続注入 … 1 テルモ生食 100mL … 0.01mL 5-FU … 2400mg/m<sup>2</sup> 所要時間:46時間0分 ⑥ 総量140mlになるように生食調整 1回</p> <hr/> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ10mL 100単位 … 1筒 ヘパフラッシュ後、抜針 1回</p>	<p>■---[注射]</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 生理食塩液 20mL … 10mL CVP穿刺用 1回</p> <hr/> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 テルモ生食 100mL … 100mL デキサト注射液6.6mg 2mL … 1mL ホウサン注 5mg 1mL … 1A 所要時間:0時間30分 ① 1回</p> <hr/> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 大塚生食注 250mL … 250mL ア-ビタックス … 250mg/m<sup>2</sup> 所要時間:1時間0分 ② 1回</p> <hr/> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 生理食塩液PL「フジー」 50mL … 50mL 所要時間:0時間30分 ③ 1回</p> <hr/> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ10mL 100単位 … 1筒 ヘパフラッシュ後、抜針 1回</p>	
投薬	<p>■---[投薬]</p> <p>アプレピタトカプセルセット「サワイ」(3日分) … 1セット 分1 朝食後 初日は点滴開始前に服用 1日</p> <hr/> <p>デカトロン錠 0.5mg … 16錠 分2 朝食後 治療翌日より2日間 2日</p> <hr/> <p>ミサイクリン塩酸塩カプセル100mg「日医工」 … 4cap 分2 朝夕食後 14日</p> <hr/> <p>ピトキサル錠 30mg … 2錠 分2 朝夕食後 14日</p> <hr/> <p>ビーソフテンローション0.3% (50g/本) … 100g 適時 1日</p> <hr/> <p>リンデロン-VG軟膏0.12% (5g/本) … 5g 医師の指示通り 皮疹のひどいところ 1日</p>		