

大腸がん mFOLFOX6療法

| | | 休薬終了日 |
|----|--|-------|
| | Day1 | Day14 |
| 注射 | <p>■---【注射】</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 生理食塩液 20mL … 10mL CVP穿刺用 1回</p> <p>-----</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 ゲラニセロン点滴静注液3mgハッグ「日医工」 100mL … 1袋 デキサート注射液6.6mg 2mL … 1mL 所要時間:0時間30分 ① 1回</p> <p>-----</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 大塚糖液 5% 250mL … 250mL レボホリナート … 200mg/m² 所要時間:2時間0分 ②-1メインルート 1回</p> <p>-----</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 大塚糖液 5% 250mL … 250mL オキサリプラチン … 85mg/m² 所要時間:2時間0分 ②-2側管よりレボホリナートと同時に投与 1回</p> <p>-----</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 生理食塩液PL「フソー」 50mL … 50mL 5-FU … 400mg/m² 所要時間:0時間15分 ③ 1回</p> <p>-----</p> <p>抗悪性腫瘍剤局所持続注入 … 1 テルモ生食 100mL … 0.01mL 5-FU … 2400mg/m² 所要時間:46時間0分 ④ 総量140mlになるように生食調整 1回</p> <p>-----</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ*10mL 100単位 … 1筒 ヘパフラッシュ後、抜針 1回</p> | |
| 投薬 | <p>■---【投薬】</p> <p>アプレビタートカプセルセット「サワイ」(3日分) … 1セット 分1 朝食後 初日は点滴開始前に服用 1日</p> <p>-----</p> <p>デカトロン錠 0.5mg … 16錠 分2 朝食後 治療翌日より2日間 2日</p> | |