

		休薬終了日
	Day1	Day14
注射	<p>■---【注射】</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 生理食塩液 20mL … 10mL CVP穿刺用 1回</p> <p>-----</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 ゲラニセロン点滴静注液3mgハッグ「日医工」 100mL … 1袋 デキサート注射液6.6mg 2mL … 1mL 所要時間:0時間30分 ① 1回</p> <p>-----</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 テルモ生食 100mL … 100mL ヘパシスマブ … 5mg/kg ② 初回90分、2回目60分、3回目以降30分で投与 1回</p> <p>-----</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 大塚糖液 5% 250mL … 250mL レホホリナート … 200mg/m² 所要時間:2時間0分 ③ 1回</p> <p>-----</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 生理食塩液PL「フソー」 50mL … 50mL 5-FU … 400mg/m² 所要時間:0時間15分 ④ 1回</p> <p>-----</p> <p>抗悪性腫瘍剤局所持続注入 … 1 テルモ生食 100mL … 0.01mL 5-FU … 2400mg/m² 所要時間:46時間0分 ⑤ 総量140mlになるように生食調整 1回</p> <p>-----</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ*10mL 100単位 … 1筒 ヘパフラッシュ後、抜針 1回</p>	
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>アプレピタントカプセルセット「サワイ」(3日分) … 1セット 分1 朝食後 初日は点滴開始前に服用 1日</p> <p>-----</p> <p>デカトロン錠 0.5mg … 16錠 分2 朝昼食後 治療翌日より2日間 2日</p>	