

			休業終了日
	Day1	Day15	Day28
注射	<p>■---【注射】</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 生理食塩液 20mL … 10mL CVP穿刺用 1回</p> <p>-----</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 テルモ生食 100mL … 100mL 輸液セットのプライミングとアバスタチン投与後のフラッシュ に使用 ① 1回</p> <p>-----</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 テルモ生食 100mL … 100mL ヘパシスマブ … 5mg/㎡ ② 初回90分、2回目60分、3回目以降30分で投与 1回</p> <p>-----</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ10mL 100単位 … 1 筒 ヘパフラッシュ後、抜針 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 生理食塩液 20mL … 10mL CVP穿刺用 1回</p> <p>-----</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 テルモ生食 100mL … 100mL 輸液セットのプライミングとアバスタチン投与後のフラッシュ に使用 ① 1回</p> <p>-----</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 テルモ生食 100mL … 100mL ヘパシスマブ … 5mg/㎡ ② 初回90分、2回目60分、3回目以降30分で投与 1回</p> <p>-----</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ10mL 100単位 … 1 筒 ヘパフラッシュ後、抜針 1回</p>	
投薬	<p>【TAS-102】 1日2回 5日間服用し2日間休業を2週間 その後14日間休業 BSA 1.07未満: 70mg/day 1.07-1.23: 80mg/day 1.23-1.38: 90mg/day 1.38-1.53: 100mg/day 1.53-1.69: 110mg/day 1.69-1.84: 120mg/day 1.84-1.99: 130mg/day 1.99-2.15: 140mg/day 2.15以上: 150mg/day</p> <p>【UFT+LV】 1日3回3週間服用1週間休業 ユーエフティ: 300mg/㎡ ユーゼル: 75mg/day</p>		