

潰瘍性大腸炎 Infiximab療法(3回目まで)

	Day1	Day15	Day43	Day98
				休薬終了日
注射	<p>■---【注射】</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン テルモ生食 100mL … 100mL ① DEHPフリー、インラインフィルター付き輸液セット使用 ルートを確保用 レミケード終了後60mL/hr 1回</p> <hr/> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン 大塚生食注 250mL … 250mL 【非探】インフリキシマブ … 5mg/m² ② インフリキシマブに差し替えた後ルートをインフリキシマブで満たすこと(約20mL早送り) 最初の10分 30mL/hr、次の10分 60mL/hr、 以後120mL/hr 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン テルモ生食 100mL … 100mL ① DEHPフリー、インラインフィルター付き輸液セット使用 ルートを確保用 インフリキシマブ終了後は60mL/hr 1回</p> <hr/> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン 大塚生食注 250mL … 250mL 【非探】インフリキシマブ … 5mg/m² ② インフリキシマブに差し替えた後ルートをインフリキシマブで満たすこと(約20mL早送り) 最初の10分 30mL/hr、次の10分 60mL/hr、 以後120mL/hr 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン テルモ生食 100mL … 100mL ① DEHPフリー、インラインフィルター付き輸液セット使用 ルートを確保用 インフリキシマブ終了後は60mL/hr 1回</p> <hr/> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン 大塚生食注 250mL … 250mL 【非探】インフリキシマブ … 5mg/m² ② インフリキシマブに差し替えた後ルートをインフリキシマブで満たすこと(約20mL早送り) 最初の10分 30mL/hr、次の10分 60mL/hr、 以後120mL/hr 1回</p>	
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>レスタミンコーワ錠 10mg … 3錠 分1 医師の指示どおり 1日</p> <hr/> <p>カロナール錠 200 … 2錠 分1 医師の指示どおり 1日</p>	<p>■---【投薬】</p> <p>レスタミンコーワ錠 10mg … 3錠 分1 医師の指示どおり 1日</p> <hr/> <p>カロナール錠 200 … 2錠 分1 医師の指示どおり 1日</p>	<p>■---【投薬】</p> <p>レスタミンコーワ錠 10mg … 3錠 分1 医師の指示どおり 1日</p> <hr/> <p>カロナール錠 200 … 2錠 分1 医師の指示どおり 1日</p>	
内服前投薬				