

| | 休業終了日 | |
|------|--|-------|
| | Day1 | Day14 |
| 注射 | <p>■---【注射】</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 生理食塩液 20mL … 10mL CVP穿刺用 1回</p> <p>-----</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 テルモ生食 100mL … 100mL アロキン静注 0.75mg 5mL … 1瓶 デキサト注射液6.6mg 2mL … 3mL 所要時間:0時間30分 ① 1回</p> <p>-----</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 大塚糖液 5% 250mL … 250mL オキサリプラチン … 85mg/m² 所要時間:2時間0分 ② 1回</p> <p>-----</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 大塚糖液 5% 250mL … 250mL レボホリナート … 200mg/m² 所要時間:2時間0分 ③-1メインルート 1回</p> <p>-----</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 大塚糖液 5% 250mL … 250mL イリリテカン … 180mg/m² 所要時間:2時間0分 ③-2側管よりレボホリナートと同時に投与 1回</p> <p>-----</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 テルモ生食 100mL … 50mL 5-FU … 400mg/m² 所要時間:0時間15分 ④ 1回</p> <p>-----</p> <p>抗悪性腫瘍剤局所持続注入 … 1 テルモ生食 100mL … 0.01mL 5-FU … 2400mg/m² 所要時間:46時間0分 ⑤ 総量140mlになるように生食調整 1回</p> <p>-----</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ10mL 100単位 … 1 筒 ヘパフラッシュ後、抜針 1回</p> | |
| 投薬 | <p>■---【投薬】</p> <p>アプレビタンカプセルセット「サワイ」(3日分) … 1セット 分1 朝食後 初日は点滴開始前に服用 1日</p> <p>-----</p> <p>デカトロン錠 0.5mg … 16錠 分2 朝食後 治療翌日より3日間 3日</p> | |
| 臨床検査 | <p>■---【検査】</p> <p>T-Bil … 1回 ALP … 1回 γ-GT … 1回 AST … 1回 ALT … 1回 LD … 1回 TP … 1回 AMY … 1回 Na … 1回 Cl … 1回 K … 1回 BUN … 1回 CRE … 1回 CRP … 1回 血算 … 1回 末梢血液像(機械法) … 1 尿定性 … 1回 尿沈渣(フローサイトメトリー法) … 1回</p> | |