

卵巣がん GC(GEM+CBDCA)療法

		休業終了日	
		Day1	Day8
		Day21	
注射	点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン テルモ生食 100mL … 100mL テキサート注射液6.6mg 2mL … 2mL アロキソ静注 0.75mg 5mL … 1瓶 所要時間:0時間30分 ① 1回	点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン テルモ生食 100mL … 100mL テキサート注射液6.6mg 2mL … 1mL 所要時間:0時間30分 ① 1回	
	点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン テルモ生食 100mL … 100mL ゲムシタビン … 1000mg/m <sup>2</sup> 所要時間:0時間30分 ② 投与時間厳守 1回	点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン テルモ生食 100mL … 100mL ゲムシタビン … 1000mg/m <sup>2</sup> 所要時間:0時間30分 ② 投与時間厳守 1回	
	点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン 大塚糖液 5% 250mL … 250mL カルボプラチン … AUC4.5.6 所要時間:1時間0分 ③ 1回	点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン 生理食塩液PL「フソー」 50mL … 50mL 所要時間:0時間15分 ③ 1回	
	点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン 生理食塩液PL「フソー」 50mL … 50mL 所要時間:0時間15分 ④ 1回		
投薬	テカトロン錠 0.5mg … 16錠 分2 朝食後 治療翌日から2日間服用 2日		