

	Day1	Day22	Day29	Day43	Day57	Day64	休薬終了日 Day84
注	<p>■—【注射】 点滴(D.I.V) … 1 末梢メイン 生理食塩液PL(7ア) 50mL … 50mL 所要時間:0時間15分 ① 1回</p> <p>点滴(D.I.V) … 1 末梢メイン F&E生食 100mL … 100mL F&E注射液6.6mg 2mL … 1.5mL 所要時間:0時間30分 ② 1回</p> <p>点滴(D.I.V) … 1 末梢メイン 大塚薬液 S1 250mL … 250mL 【非経】キシル … 40mg/ml 所要時間:1時間30分 ③ トキソ40mg/回を超える場合は5%TZ500mlで 希釈し120分で投与 1回</p> <p>点滴(D.I.V) … 1 末梢メイン 生理食塩液PL(7ア) 50mL … 50mL 所要時間:0時間15分 ④ 1回</p> <p>点滴(D.I.V) … 1 末梢メイン F&E生食 100mL … 100mL F&E注射液 … 15mg/kg ⑤ 初回90分、2回目40分、3回目以降30分で投与 1回</p> <p>点滴(D.I.V) … 1 末梢メイン 生理食塩液PL(7ア) 50mL … 50mL 所要時間:0時間15分 ⑥ 1回</p>	<p>■—【注射】 点滴(D.I.V) … 1 末梢メイン F&E生食 100mL … 100mL 輸液水のプライミング、BEV投与後のフラッシュに使用 ① 1回</p> <p>点滴(D.I.V) … 1 末梢メイン F&E生食 100mL … 100mL F&E注射液6.6mg 2mL … 1.5mL 所要時間:0時間30分 ② 1回</p> <p>点滴(D.I.V) … 1 末梢メイン 大塚薬液 S1 250mL … 250mL 【非経】キシル … 40mg/ml 所要時間:1時間30分 ③ トキソ40mg/回を超える場合は5%TZ500mlで 希釈し120分で投与 1回</p> <p>点滴(D.I.V) … 1 末梢メイン 生理食塩液PL(7ア) 50mL … 50mL 所要時間:0時間15分 ④ 1回</p>	<p>■—【注射】 点滴(D.I.V) … 1 末梢メイン 生理食塩液PL(7ア) 50mL … 50mL 所要時間:0時間15分 ① 1回</p> <p>点滴(D.I.V) … 1 末梢メイン F&E生食 100mL … 100mL F&E注射液6.6mg 2mL … 1.5mL 所要時間:0時間30分 ② 1回</p> <p>点滴(D.I.V) … 1 末梢メイン 大塚薬液 S1 250mL … 250mL 【非経】キシル … 40mg/ml 所要時間:1時間30分 ③ トキソ40mg/回を超える場合は5%TZ500mlで 希釈し120分で投与 1回</p> <p>点滴(D.I.V) … 1 末梢メイン 生理食塩液PL(7ア) 50mL … 50mL 所要時間:0時間15分 ④ 1回</p>	<p>■—【注射】 点滴(D.I.V) … 1 末梢メイン F&E生食 100mL … 100mL 輸液水のプライミング、BEV投与後のフラッシュに使用 ① 1回</p> <p>点滴(D.I.V) … 1 末梢メイン F&E生食 100mL … 100mL F&E注射液6.6mg 2mL … 1.5mL 所要時間:0時間30分 ② 1回</p> <p>点滴(D.I.V) … 1 末梢メイン 大塚薬液 S1 250mL … 250mL 【非経】キシル … 40mg/ml 所要時間:1時間30分 ③ トキソ40mg/回を超える場合は5%TZ500mlで 希釈し120分で投与 1回</p> <p>点滴(D.I.V) … 1 末梢メイン 生理食塩液PL(7ア) 50mL … 50mL 所要時間:0時間15分 ④ 1回</p>	<p>■—【注射】 点滴(D.I.V) … 1 末梢メイン F&E生食 100mL … 100mL 輸液水のプライミング、BEV投与後のフラッシュに使用 ① 1回</p> <p>点滴(D.I.V) … 1 末梢メイン F&E生食 100mL … 100mL F&E注射液6.6mg 2mL … 1.5mL 所要時間:0時間30分 ② 1回</p> <p>点滴(D.I.V) … 1 末梢メイン 大塚薬液 S1 250mL … 250mL 【非経】キシル … 40mg/ml 所要時間:1時間30分 ③ トキソ40mg/回を超える場合は5%TZ500mlで 希釈し120分で投与 1回</p> <p>点滴(D.I.V) … 1 末梢メイン 生理食塩液PL(7ア) 50mL … 50mL 所要時間:0時間15分 ④ 1回</p>	<p>■—【注射】 点滴(D.I.V) … 1 末梢メイン F&E生食 100mL … 100mL 輸液水のプライミング、BEV投与後のフラッシュに使用 ① 1回</p> <p>点滴(D.I.V) … 1 末梢メイン F&E生食 100mL … 100mL F&E注射液6.6mg 2mL … 1.5mL 所要時間:0時間30分 ② 1回</p> <p>点滴(D.I.V) … 1 末梢メイン 大塚薬液 S1 250mL … 250mL 【非経】キシル … 40mg/ml 所要時間:1時間30分 ③ トキソ40mg/回を超える場合は5%TZ500mlで 希釈し120分で投与 1回</p> <p>点滴(D.I.V) … 1 末梢メイン 生理食塩液PL(7ア) 50mL … 50mL 所要時間:0時間15分 ④ 1回</p>	
投薬							