

卵巣がん PLD+BEV療法(各4週毎)

|    |   | 休薬終了日 |
|----|---|-------|
|    | Day1  | Day28 |
| 注射 | <p>■---【注射】</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1<br/>末梢メイン<br/>生理食塩液PL「フソー」 50mL … 50mL<br/>所要時間:0時間15分</p> <p>①<br/>1回</p> <p>-----</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1<br/>末梢メイン<br/>テルモ生食 100mL … 100mL<br/>デキサト注射液6.6mg 2mL … 1.5mL<br/>所要時間:0時間30分</p> <p>②<br/>1回</p> <p>-----</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1<br/>末梢メイン<br/>大塚糖液 5% 250mL … 250mL<br/>【非探】ドキシル … 40mg/m<sup>2</sup><br/>所要時間:1時間30分</p> <p>③<br/>ドキシル90mg/回を超える場合は5%TZ500mlで希釈し120分で投与<br/>1回</p> <p>-----</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1<br/>末梢メイン<br/>生理食塩液PL「フソー」 50mL … 50mL<br/>所要時間:0時間15分</p> <p>④<br/>1回</p> <p>-----</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1<br/>末梢メイン<br/>テルモ生食 100mL … 100mL<br/>アパズチン … 15mg/kg</p> <p>⑤<br/>初回90分、2回目60分、3回目以降30分で投与<br/>1回</p> <p>-----</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1<br/>末梢メイン<br/>生理食塩液PL「フソー」 50mL … 50mL<br/>所要時間:0時間15分</p> <p>⑥<br/>1回</p> |       |
| 投薬 |   |       |