

非小細胞肺癌 CBDCA+PEM療法

		休薬終了日
	Day1	Day21
注射	<p>■---【注射】</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン グラニセロン点滴静注液3mgﾊﾞｯｸﾞ「日医工」 100mL … 1袋 デキサト注射液6.6mg 2mL … 2mL 所要時間:0時間30分</p> <p>① 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン テルモ生食 100mL … 100mL アリムタ … 500mg/m<sup>2</sup> 所要時間:0時間10分</p> <p>② 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン 大塚生食注 250mL … 250mL 所要時間:0時間30分</p> <p>③ 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン 大塚生食注 250mL … 250mL カルボプラチン … AUC4 5 6 所要時間:1時間30分</p> <p>④ 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン 生理食塩液PL「フソー」 50mL … 50mL 所要時間:0時間15分</p> <p>⑤ 1回</p>	
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>アプレヒタントカプセルセット「サワイ」(3日分) … 1セット 分1 朝食後 初日は点滴開始前に服用 1日</p> <p>-----</p> <p>デカトン錠 0.5mg … 16錠 分2 朝昼食後 治療翌日より2日間服用 2日</p>	
PEM副作用予防(投与7日前から治療中止後22日まで)	<p>葉酸(0.5g連日服用) VitB12(1mg筋肉内注射9週ごと)</p>	