

| | | | 休業終了日 |
|----|---|------|-------|
| | Day1 | Day3 | Day14 |
| 注射 | <p>■---【注射】</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン テルモ生食 100mL … 100mL アロキン静注 0.75mg 5mL … 1瓶 デキサート注射液6.6mg 2mL … 3mL 所要時間:0時間15分 輸液セットはケモセーフを使用 アプレピタント不使用时デキサート19.8mg</p> <p>① 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン 生理食塩液PL「フソー」 50mL … 50mL エビルピシ … 90mg/m² 所要時間:0時間15分</p> <p>② 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン テルモ生食 100mL … 100mL エンドキサン … 600mg/m² 所要時間:0時間30分</p> <p>③ 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン 生理食塩液PL「フソー」 50mL … 50mL 所要時間:0時間15分</p> <p>④ 1回</p> | | |
| 投薬 | <p>■---【投薬】</p> <p>アプレピタントカプセルセット「サワイ」(3日分) … 1セット 分1 朝食後 初日は点滴開始前に服用 1日</p> | | |