

	Day1	Day2
注射	<p>■---【注射】</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン 大塚生食注 50mL … 50mL 所要時間:0時間5分 インラインフィルター付き輸液セット使用 ① 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン テセントリク … 1200mg/body 大塚生食注 250mL … 250mL 所要時間:0時間30分 初回は60分かけて投与 ② 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン 大塚生食注 50mL … 50mL 所要時間:0時間5分 ③ 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「日医工」 100mL … 1袋 テキサート注射液6.6mg 2mL … 2mL 所要時間:0時間30分 ④ 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン 大塚生食注 250mL … 250mL カルホフラチン … AUC4,5,6 所要時間:1時間0分 ⑤ 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 大塚生食注 50mL … 50mL 所要時間:0時間5分 ⑥ 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 生理食塩液バッグ「フソー」500mL … 1袋 ラステット … 100mg/m<sup>2</sup> 所要時間:1時間0分 フィルターの下部の側管から投与 ⑦ 希釈後3時間以内に投与終了する 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 大塚生食注 50mL … 50mL 所要時間:0時間5分 フィルターの下部の側管から投与 ⑧ 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン 大塚生食注 250mL … 250mL 所要時間:2時間0分 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 テキサート注射液6.6mg 2mL … 2mL テルモ生食 100mL … 100mL 所要時間:0時間30分 ① 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 生理食塩液バッグ「フソー」500mL … 1袋 ラステット … 100mg/m<sup>2</sup> 所要時間:1時間0分 ② 希釈後3時間以内に投与終了する 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 大塚生食注 50mL … 50mL 所要時間:0時間5分 ③ 1回</p>
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>アプレビタントカプセルセット「サワイ」(3日分) … 1セット 1日1回朝食後 初日は点滴開始前に服用 1日</p>	

	休薬終了日
Day3	Day28
<p>■—【注射】</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン 大塚生食注 250mL … 250mL 所要時間:2時間0分 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 テキサト注射液6.6mg 2mL … 2mL テルモ生食 100mL … 100mL 所要時間:0時間30分 ① 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 生理食塩液バッグ「フソ」 500mL … 1袋 ラステット … 100mg/m<sup>2</sup> 所要時間:1時間0分 ② 希釈後3時間以内に投与終了する 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 大塚生食注 50mL … 50mL 所要時間:0時間5分 ③ 1回</p>	