

大腸がん Cmab単剤療法(2週間間隔投与)

		休業終了日
	Day1	Day14
注射	<p>■---【注射】</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 生理食塩液 20mL … 10mL CVP穿刺用 1回</p> <p>-----</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 テルモ生食 100mL … 100mL デキサト注射液6.6mg 2mL … 1mL ホラミン注 5mg 1mL … 1A 所要時間:0時間30分 ① 1回</p> <p>-----</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 大塚生食注 250mL … 250mL アビタックス … 500mg/m<sup>2</sup> 所要時間:2時間0分 ② 1回</p> <p>-----</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 大塚生食注 50mL … 50mL 所要時間:0時間30分 ③ 1回</p> <p>-----</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ10mL 100単位 … 1筒 ヘパフラッシュ後に抜針 1回</p>	
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」 … 4錠 分2 朝夕食後 14日</p> <p>-----</p> <p>ピトキサル錠 30mg … 2錠 分2 朝夕食後 14日</p> <p>-----</p> <p>ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」(50g/本) … 100g 適時 1日</p> <p>-----</p> <p>リンデロン-VG軟膏0.12% (5g/本) … 10g 医師の指示通り 皮膚のひどいところ 1日</p>	