

悪性軟部腫瘍 Trabectedin療法

| | | | 休薬終了日 |
|----|--|--|-------|
| | Day1 | Day2 | Day21 |
| 注射 | <p>■---【注射】</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 生理食塩液 20mL … 10mL CVP穿刺用 1回</p> <p>-----</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 パロ/セトン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」 … 1袋 デキサート注射液6.6mg 2mL … 5mL 所要時間:0時間30分 ① 1回</p> <p>-----</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 大塚生食注 50mL … 50mL 所要時間:0時間30分 ② デキサート注終了の30分後からオンテリス投与開始 するため 1回</p> <p>-----</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 (1L)テルモ生食 1L … 1袋 【非採】オンテリス … 1.2mg/m² 所要時間:24時間0分 ③ 1mgあたり20mLの生食で溶解後、点滴バッグに 注入 溶解から30時間以内に投与終了する(溶解後6 時間以内に点滴を開始する) 1回</p> | <p>■---【注射】</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 大塚生食注 50mL … 50mL 所要時間:0時間15分 ④オンテリス終了後フラッシュ 1回</p> <p>-----</p> <p>中心静脈注射(C.V.) … 1 へパフラッシュ10単位/mLシリンジ10mL 100単位 … 1 筒 へパフラッシュ後、抜針 1回</p> | |
| 投薬 | | | |